


¡PROTÉJASE Y A SU FAMILIA CONTRA LA ENFERMEDAD DE LYME Y OTRAS ENFERMEDADES LLEVADAS POR GARRAPATAS!

➔ Evite los lugares donde habitan las garrapatas: los bosques, hierbas altas, paredes de piedra, las áreas cubiertas con hojas.



➔ Vista correctamente cuando este en áreas infestadas de garrapatas: sombrero, mangas largas, pantalones largos remetidos en calcetines.

➔ Repelentes de insecto puede ser usado en la ropa y en la piel. Siempre siga la intrusiones particularmente con los niños.



➔ Antes de venir dentro, cepille y sacuda la ropa.

➔ Revítese diariamente por garrapatas. Examine el cuerpo entero, especialmente donde tenga pelo, debajo de los brazos, partes privadas, y partes posteriores de las rodillas.

➔ Extraiga cualquier garrapata pronto y apropiadamente. Con unas pinzas, agarre la garrapata cerca de las partes de la boca (lo más cerca de la piel). Desprenda la garrapata con un movimiento firme hacia arriba. No aplaste ni oprima la garrapata.

ESTE AL TANTO DE LOS SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD DE LYME: UNA ERUPCIÓN DE COLOR ROJO O SÍNTOMAS DE CATARRO. CONSULTE CON SU DOCTOR.



El Departamento de Salud de Greenwich
División de Laboratorio
Town Hall
101 Field Point Road
Greenwich, CT 06830

Horas: Lunes—Viernes 8:00—3:00
203-622-7843

El Departamento de Salud de Greenwich **LABORATORIO**

ENFERMEDAD DE LYME

Análisis de Garrapatas
203-622-7843



División de Laboratorio

203-622-7843

EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE GREENWICH LABORATORIO

¿QUÉ DEBO HACER SI ENCUENTRO UNA

GARRAPATA EN MÍ? ¡No se asuste! No todas las garrapatas están infectadas, y si esta infectada la garrapata, los estudios han demostrado que no generalmente transmiten las bacterias que causa la enfermedad de Lyme por 36 a 72 horas después de haberle picado. Por lo tanto, la posibilidad de contraer la enfermedad de Lyme se reducen gradualmente si usted se quita la garrapata en plazo de las primeras 24 horas.

1. Con un par de pinzas, agarre la garrapata cerca de las partes de la boca (lo más cerca posible de la piel). Desprenda la garrapata con un movimiento firme hacia arriba.
2. Ponga la garrapata en un frasco o un tarro y cerciórese de que está cubierto.
3. Enjuague el área desinfectando el sitio de la picadura.
4. Traiga la garrapata (muerta o viva) al Departamento de Salud en el Town Hall de Greenwich para hacerle la prueba de Lyme y la enfermedad de Babesiosis. Este servicio requiere un pago.
5. El Departamento de Salud le dará un papel y le enviará los resultados por correo directamente.
6. Anote la fecha y el sitio de la picadura durante los treinta días este al tanto de los primeros síntomas de la enfermedad.



¿CÓMO LAS PERSONAS CONTRAEN LA

ENFERMEDAD DE LYME? Por picadura de una garrapata infectada con la bacteria que causa Lyme.

¿CUÁLES SON LAS SEÑALES Y SÍNTOMAS DE LA

ENFERMEDAD DE LYME? El 50% de los pacientes desarrollarán una erupción circular de color rojo, acompañada por cansancio, fiebre, dolor de cabeza, cuello tieso, dolores de músculo, en las dos primeras semanas de la infección. Si no es tratado, los pacientes pueden desarrollar artritis, incluyendo episodios intermitentes de hinchazón y dolor en las articulaciones, frecuentemente en la rodilla.

¿CUÁL ES EL PERIODO DE LA INCUBACIÓN PARA

LA ENFERMEDAD DE LYME? Una erupción circular de color rojo usualmente aparece entre 7 a 14 días después de ser expuesto a una garrapata. Sin embargo, algunos pacientes nunca desarrollan las primeras síntomas de la enfermedad de Lyme.

¿CUÁL ES EL CICLO BÁSICO DE LA

TRANSMISION? Las garrapatas no maduras se infectan alimentándose de la sangre de roedores pequeños, por ejemplo el ratón blanco, u otros mamíferos infectados con la bacteria que causa la enfermedad de Lyme. En fases más posteriores, estas garrapatas entonces transmiten la enfermedad de Lyme a los seres humanos y a otros mamíferos durante el proceso de alimentación.

¿CÓMO SE TRATA LA ENFERMEDAD DE LYME?

La enfermedad de Lyme es tratada con antibióticos. Si usted piensa que usted puede tener la enfermedad de Lyme, vea a su doctor inmediatamente. El tratamiento tiene mayor probabilidad de tener éxito cuando se comienza temprano.

¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO DE CONTRAER LA

ENFERMEDAD DE LYME? Garrapatas infectadas con la enfermedad de Lyme han sido encontrada en cada vecindad de Greenwich. Todos los residentes de Greenwich que trabajan o juegan al aire libre, particularmente en áreas pesadamente enselvadas, están en riesgo para contraer la enfermedad de Lyme.

¿PUEDE UNA PERSONA SER REINFECTADA

CON LA ENFERMEDAD DE LYME? Sí, haber tenido la enfermedad de Lyme no le protege contra la infección. Esto provoca la necesidad de prevención continua de la garrapata tal como ropa apropiada, chequeo diariamente, y rápida acción de quitarse la garrapata del cuerpo.

¿LA ENFERMEDAD DE LYME ES TEMPORAL IN

SU OCCURENCIA? Mayormente las personas contraen la enfermedad de Lyme en la primavera y el verano, cuando las garrapatas ninfas son mas activas y la población humana esta al aire libre. Pero las garrapatas pueden también ser activas en las días calientes de invierno.

¡HAGA SU HOGAR MÁS SEGURO!

- Más niños contraen la enfermedad de Lyme que cualquier otra categoría de edad. Mueva el columpio de juego fuera de la sombra y póngalo en un lugar donde haiga mucho sol. ¡Las garrapatas odian el sol!
- Crear una barrera de madera entre sus césped y las maderas. Esto mantendrá las garrapatas en las maderas y fuera de su yarda.

